

- No permitir que aves muertas de la granja, sean utilizadas como alimento de otros animales.
- Las aves deberán ser incineradas o depositadas en fosas sépticas utilizando una capa de cal entre cada cama de aves y tierra.



¡No te confundas!

Los signos clínicos de la Influenza Aviar pueden ser muy similares a aquellos producidos por otras enfermedades aviares como son la Bronquitis Infecciosa, Laringotraqueitis Infecciosa, Cólera Aviar y las diversas formas de la Enfermedad de Newcastle, por lo que es necesario recurrir a las pruebas de laboratorio que permitan identificar el virus de la Influenza Aviar o sus anticuerpos específicos.

Si detectas algún signo característico de esta enfermedad en tus aves

¡Repórtalo inmediatamente!

Emergencias CPA:
800 751 2100 (24 HORAS)

Lun. a Vie. 55 5905 1000
exts. 51236, 51242, 51243, 53205 o 53213
gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx

COMITÉ DE FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C.

Carretera Juan Crispín - Chicoasén Km. 2.5
Col. Juan Crispín. SAGyP C.P. 29020
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel. 961 671 9349
www.cfpichiapas.org
www.osiap.org.mx

Síguenos en nuestras Redes Sociales



@cfppchiapas

gob.mx/agricultura

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político
quedá prohibido su uso para fines diferentes a los establecidos.

gob.mx/senasica



Diseminación de la enfermedad


La enfermedad se puede diseminar por el manejo inadecuado de las aves infectadas, gallinaza y otros productos avícolas, además de cajas y separadores de huevo, equipo y transportes; también las personas a través de su ropa, zapatos y sus vehículos.



Las aves silvestres, los insectos y roedores pueden llevar el virus de las aves infectadas a las susceptibles.



El avicultor debe extremar sus “medidas de bioseguridad” para prevenir la entrada de la influenza aviar en sus parvadas:



- Mantener cerradas las puertas de la granja y las naves.
- Crear conciencia en todo el personal sobre el problema.
- Pedir a todos los trabajadores no tener aves en sus casas.
- Permitir solamente la entrada del personal esencial a la granja y controlar sus movimientos.
- No permitir la entrada a visitantes ocasionales.
- Proporcionar ropa apropiada y medios para la limpieza y desinfección a los trabajadores de la granja.
- Limpiar y desinfectar completamente las naves y otras instalaciones entre parvadas.



Arco, vado y tapetes sanitarios

- Controlar la entrada y salida de aves y sus productos (incluyendo huevos), así como del equilibrio utilizado en la explotación.
- En parvadas de aves ponedoras aceptar solamente empaques y cajas de huevo nuevas.
- Evitar traspasos de alimento de granja a granja.
- Evitar que personal de vacunación o de servicio que haya estado en contacto con otras explotaciones de aves en las 24 horas anteriores, tenga contacto con la parvada.
- Implementar un programa de control de insectos y fauna nociva (ratas, ratones, perros, gatos y aves silvestres).



Limpieza y desinfección de equipos y vehículos

- Controlar el movimiento relacionado con el manejo y destrucción de aves muertas, camas gallinaza o pollinaza.
- Practicar el método de "todo dentro todo fuera".
- Programar un lapso de tiempo entre parvada y parvada que permita que los desinfectantes y los insecticidas eliminen los microbios y los insectos.
- No visitar otras explotaciones de aves.
- Utilizar métodos que garanticen la eliminación viral en la pollinaza y gallinaza, antes de comercializarlas para que no le presenten ningún riesgo sanitario.