

COCHINILLA ROSADA DEL HIBISCO (CRH)

Dispersión

- » Agua
- » Viento
- » Animales
- » Plantas infestadas
- » Herramientas de manejo
- » Vías de transporte y vehículos

Movilización y comercialización de material propagativo y plantas hospedantes

Es una plaga cuarentenaria que se alimenta de especies y familias botánicas, como árboles forestales, frutales, plantas ornamentales y hortalizas.

Las plantas susceptibles:

- » Guanábana, guayaba, mango
- » Jamaica, tamarindo
- » Teca
- » Plantas ornamentales
- » Algunos cítricos.

Control biológico:

- Liberación de agentes de control biológico en las diferentes zonas infestadas:
- » Anagyrus kamali
 - » Cryptolaemus montrouzieri

Síntomas o daños

- » Severa deformación de las hojas y brotes tiernos (enchinamiento)
- » Acortamiento de entrenudos
- » Invasión y malformación de frutos
- » Presencia de manchas negras, similares al hollín (fumagina), sobre las hojas y tallos
- » En casos extremos, muerte de la planta

En caso de detectar una planta con los síntomas se sugiere:

- » Podar y eliminar las plantas que se encuentran positivas a la CRH en las zonas bajo control y zonas aledañas.
- » Eliminar residuos de malezas, limpiar camellones, canales de distribución de agua y áreas de producción agrícola afectada.
- » Aplicar una solución jabonosa o con aceite antes de podar follaje o frutos.
- » Incinerar directamente las áreas donde se realizan las podas.

NOTIFICA cualquier caso sospechoso:

01 800 987 98 79

alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx

Comité Estatal o Junta Local de Sanidad Vegetal del Estado
osiap.org.mx