

Avances en las modificaciones en la NOM-041-ZOO, Campaña Nacional contra la Brucelosis de los animales



Dirección General de Salud Animal

Generalidades

- Diferenciación de los requisitos de brucelosis bovina, brucelosis caprina y brucelosis ovina (cepas lisas) y brucelosis ovina (cepas rugosas)
- Inclusión de cinco fases de campaña
- Coberturas de vacunación como requisito para cambio de fase (excepto cuando se demuestre riesgo bajo)
- Planes de trabajo para cambio de fase
- Inclusión de nuevas pruebas diagnósticas para brucelosis bovina y ovina
- Armonización con requisitos de OIE

Fases de campañas

- Se reconocen las fases en control, control avanzado, erradicación preparatoria, erradicación y libre de brucelosis.
- Pueden ser consideradas a nivel municipal, regional o estatal. Para efectos de esta Norma la denominación de fases y zonas son equivalentes.

Fases de campañas

- Los estados, regiones o municipios que no cumplan al menos los requisitos de la fase en control serán declarados “sin clasificación”.

Requisitos Generales de las Fases

- *Aprobación expresa de la Secretaría*
- *Contar con un padrón estatal de productores y censo ganadero*
- *Control de la movilización conforme a lo establecido*
- *Contar con un programa continuo de promoción de la Campaña*
- *Contar con Infraestructura de servicios veterinarios, técnicos y de diagnóstico*

Requisitos de fase en control

- *Contar con un programa de vacunación por región*
- *Contar con un programa de Vigilancia epidemiológica con la prueba de anillo en leche en explotaciones lecheras y centros de acopio*

Requisitos de fase en control avanzado

- Contar con una cobertura de vacunación del 75% de los hatos en un periodo no mayor de 36 meses
- Prevalencia de hatos mayor o igual al 3%
- Programa de Vigilancia epidemiológica con la prueba de anillo en leche del 100% de las explotaciones lecheras y centros de acopio
- Instaurar un plan de manejo de hato infectado en todos y cada uno de los hatos con animales positivos a las pruebas diagnósticas

Requisitos de fase en Erradicación preparatoria

- Contar con el 100% de los hatos inscritos en la campaña
- Contar con una cobertura de vacunación del 100% de los hatos, salvo que se demuestre que no hay riesgo de infección en la zona mediante análisis de riesgo técnicamente sustentado
- Prevalencia de hato menor al 3% y mayor al 1.5% con distribución conocida
- Sacrificio de animales positivos verificable por un médico oficial o verificador

Requisitos de fase en Erradicación preparatoria (2)

- Mantener un programa de Vigilancia epidemiológica con la prueba de anillo en leche.
- Iniciar un programa de Vigilancia epidemiológica en rastros y mataderos
Elaborar un Plan de trabajo para alcanzar la fase erradicación
- Instaurar un plan de manejo de hato infectado.

Requisitos de fase en Erradicación

- Contar con una cobertura de vacunación del 100% de los hatos, salvo que se demuestre que no hay riesgo de infección en la zona mediante análisis de riesgo técnicamente sustentado.
- Prevalencia de hato menor al 1.5% con distribución conocida
- Mantener un programa de Vigilancia epidemiológica con la prueba de anillo en leche del 100% de las explotaciones lecheras y centros de acopio

Requisitos de fase en Erradicación (2)

- Programa de Vigilancia epidemiológica en rastros y mataderos
- Instaurar un plan de manejo de hato infectado
- Elaborar un Plan de trabajo para alcanzar la fase libre

Requisitos de fase en Libre

- Haber permanecido sin evidencia de brucelosis en los bovinos por un mínimo de 24 meses
- Control estricto de la movilización
- Contar con un programa continuo de monitoreo de la campaña
- Mantener un programa de Vigilancia epidemiológica con la prueba de anillo en leche del 100% de las explotaciones lecheras y centros de acopio.

Requisitos de fase en Libre (2)

- Mantener un programa de Vigilancia epidemiológica en rastros y mataderos
- Elaborar un Plan de trabajo para alcanzar la fase libre