

# LA RABIA PARALÍTICA

Es una enfermedad mortal y no es curable, afecta a los animales mamíferos y al humano, es causada por un virus (*Lyssavirus*), el cual se transmite a través de la mordedura o el contacto con la saliva de un animal rabioso a un animal sano.

Cuando se presenta en especies ganaderas también se le conoce como DERRIENGUE.

El principal transmisor de la rabia al ganado es el murciélagos hematófago (*Desmosus rotundus*) o “vampiro” el cual se alimenta únicamente de sangre.

## OBJETIVO DE LA CAMPAÑA

Diagnosticar y prevenir la presencia de rabia en el ganado y controlar las poblaciones de murciélagos hematófagos.

## ACTIVIDADES DE CONTROL

Se realizan capturas de murciélagos hematófagos en los corrales o refugios, con la finalidad de disminuir sus poblaciones, aplicándoles pomadas vampiricidas (tanto a los murciélagos como al ganado) que actúan de forma selectiva contra este tipo de murciélagos.

## SÍNTOMAS

- Cambios de conducta, depresión o agresividad, inquietud.
- Temblores musculares.
- La incoordinación o parálisis es más común en las patas traseras (Derriegados).
- Salivación excesiva
- Heces secas y dificultad para defecar (pujo).

- Postración y muerte.

## RECOMENDACIONES:

- Comunica a las autoridades sanitarias las agresiones de vampiro en tu ganado.
- Realiza el control del vampiro en tu comunidad con asesoría del personal del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria.
- No trates de capturar y controlar murciélagos sin asesoría profesional.
- No manipules los animales muertos o enfermos, ya que te puedes contagiar de rabia.
- Si tienes contacto con otro tipo de murciélagos, que no se alimentan de sangre, debes avisar de su existencia al personal del Comité.

