

¡RECUERDE!

La brucelosis ocasiona significativas pérdidas económicas por:

- Disminución de fertilidad en las hembras
- Abortos
- Nacimiento de animales débiles
- Disminución en la producción de leche



**LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS Y
EL RIESGO DE TRANSMISIÓN AL
SER HUMANO NOS OBLIGA A
COMBATIRLA.**

¡SR. GANADERO!

La salud de su ganado se refleja en la salud humana

**¡Ayúdanos a acabar con la Brucelosis!
¡Vacuna tu ganado!**



Informes:

Comité Estatal para el Fomento y Protección
Pecuaria de Zacatecas S.C.
Carr. Panamericana Km 27.5 S/N
Calera, Zacatecas
(478) 98 5 07 95 - (478) 95 5 25 80
Fax: (478) 98 5 15 02

www.cefoppz.org



Cefopp Zacatecas

www.gob.mx/sagarpa

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

www.gob/senasica



¿QUÉ ES LA BRUCELOISIS?

Una enfermedad que afecta a los animales y al humano (zoonosis), de evolución crónica, causada por una bacteria llamada Brucella.

¿CÓMO AFECTA A LOS ANIMALES?

En los animales provoca:

- Infertilidad
- Disminución en la producción
- Nacimiento de animales débiles
- En algunos casos aborto en el último tercio de la gestación



¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?

Mediante un análisis de sangre a todos los animales de su hato. Para ello se debe muestrear el ganado y enviar la sangre al laboratorio para su diagnóstico.

¿CÓMO SE PREVIENE?

- Vacunando a todas las hembras del hato
- Introducir solamente animales que provengan de Hato libre o con Prueba Negativa Vigente



¿CÓMO SE DISEMINA LA ENFERMEDAD UNA VEZ QUE INGRESÓ AL HATO?

La enfermedad se transmite por el contacto directo entre los animales. Una vaca, una cabra u oveja preñada infectada, aborta y libera al ambiente millones de bacterias a través del feto, placenta y flujo vaginal, contaminando los pastos, agua y alimentos con la bacteria, la cual es muy resistente en el ambiente.

BRUCELOISIS EN LOS HUMANOS ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

Fiebres intermitentes, dolores musculares y articulares, malestar general y debilidad. Otros síntomas son pérdida de peso, pérdida de apetito, fatiga prolongada e incluso la muerte si no es tratado a tiempo.

¿CÓMO SE TRANSMITE A LOS HUMANOS?

Los más propensos a contagiarse son los propietarios del ganado y sus familias, los Médicos Veterinarios y los trabajadores de los ranchos. Se transmite generalmente por:

Contacto directo con animales infectados
Por el consumo de leche y productos lácteos que no han sido pasteurizados.

RECOMENDACIONES

1.- Su Médico Veterinario mediante el muestreo le puede indicar si tiene la enfermedad en su ganado. Los animales positivos a las pruebas diagnósticas deben ser sacrificados.

2.- Después de ser sacrificados debe vacunar el resto de los animales hembras.

3.- Si no tiene animales positivos cuide su hato, tenga mucho cuidado al comprar reproductores (hembras y machos), exija que provengan de Hato Libre o con Prueba Negativa Vigente.